

TRASLADO DEL PACIENTE EN AMBULANCIA

COMITÉ DE CONTROL DE INFECCIONES

HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN ROQUE



RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO DE PACIENTE
EN AMBULANCIA CON PRESUNCION O DIAGNOSTICO
DE COVID-19

TRANSMISIÓN POR GOTAS Y CONTACTO

LAVADO DE MANOS

**UNA DE LAS MEDIDAS MÁS IMPORTANTE
PARA EL CONTROL DE LAS INFECCIONES
ASOCIADAS A LOS CUIDADOS DE LA SALUD**

AMBULANCIA

En caso de que se precise el traslado del paciente o búsqueda del mismo en otra institución o hogar, este se hará en una unidad de traslado con cabina del conductor físicamente separada del área del paciente. El personal de salud asignado a traslado debe seguir la normas de traslado para COVID-19

INFORMACION

El personal que intervenga en el traslado deberá ser previamente informado y verificar la disponibilidad de los EPP.

MATERIAL

Los objetos desechables contaminados se eliminarán en contenedor con bolsa roja

**La limpieza y desinfección se realizará
siempre después de terminado el
traslado**

Se respetará el circuito diseñado por las autoridades del Hospital Materno Infantil San Roque, para la admisión del paciente

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

- ✓ Higiene de manos: respetando los cinco momentos del lavado de manos.
- ✓ Educación al personal de salud

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

- ✓ **GUANTES** descartables
- ✓ **BATA:** limpia no estéril suplementaria al uniforme, si se toma muestra se colocará la bata Hidrorepelente
- ✓ **BARBIJO QUIRÚRGICO**/si se toma la muestra se colocará **barbijo N°95**
- ✓ **ANTIPARRA:** desinfectarla con alcohol al 70%
- ✓ Limpieza y desinfección de las superficies del entorno del paciente y elementos utilizados en su atención, con desinfectante Sulfanios Premium
- ✓ Ingreso restringido
- ✓ Elementos biomédicos de uso exclusivo.

LIMPIEZA

Los pisos, superficies horizontales y verticales, se limpiarán con solución desinfectante en uso en la institución Sulfanios Premium. La ropa sucia debe recogerse en bolsas blancas y se cerrarán adecuadamente.

OBSERVACIONES

Las antiparras deben ser desinfectadas con alcohol al 70%

El uso de equipos de protección personal, por el personal de salud que estén a cargo del traslado requiere de la evaluación de riesgo relacionada a las actividades de salud.